

## 予防接種 日程表

◆定期接種：定められた期間であれば公費（無料）で受けられる予防接種で、接種の対象者は法律により定められています。対象の方へ接種の期日、場所等個別通知します。

### 個別接種

指定の医療機関で予防接種を受けていただきます。詳しくは対象の方に郵送します案内をご覧ください。同日に2種類以上のワクチンを接種する同時接種も可能です。(例)「ロタ」、「ヒブ」と「肺炎球菌」「B型肝炎」と「四種混合」「ヒブ」と「肺炎球菌」と「B型肝炎」。ただし、医療機関により同時接種を行わない場合や、可能なワクチンの数が異なりますので、予約の際にご確認ください。

### 集団接種

保健福祉センターを会場に予防接種を行います。予約は不要です。

## 乳幼児



予防接種名	対象者(標準的な接種期間)	回数	間隔等
ロタウイルス	ロタテック5価:生後6週～生後32週まで ロタリックス1価:生後6週～生後14週6日まで *最初に受けたワクチンと同じ種類を接種してください	ロタテック (3回)	27日以上の間隔をあけて3回 経口接種
		ロタリックス (2回)	27日以上の間隔をあけて2回 経口接種
ヒブ	生後2ヶ月～5歳未満 (初回:生後2ヶ月～生後7ヶ月未満)	初回:3回	27日以上の間隔をあけて3回接種
		追加:1回	初回接種終了後7月～13月の間隔をあけて1回接種
肺炎球菌	生後2ヶ月～5歳未満 (初回:生後2ヶ月～生後7ヶ月未満) (追加:1歳～1歳3ヶ月未満)	初回:3回	27日以上の間隔をあけて3回接種
		追加:1回	初回接種終了後60日以上の間隔をあけて、1歳に至った日以降に1回接種
B型肝炎	生後2ヶ月～1歳未満 (生後2ヶ月～生後9ヶ月未満)	初回:2回	27日以上の間隔をあけて2回接種
		追加:1回	第1回目の接種から139日以上の間隔をあけて1回接種
四種混合	生後3ヶ月～7歳6ヶ月未満 (初回:生後3ヶ月～1歳未満)	初回:3回	20以上の間隔をあけて3回接種
		追加:1回	初回接種終了後、約1年から1年6ヶ月の間隔をあけて1回接種

	月	日	場所	受付時間	対象者
BCG・日本脳炎	4月	20日(火)	保健福祉センター	午後1時から 1時25分	<b>BCG</b> 生後5ヶ月以上8ヶ月未満
	5月	24日(月)			<b>日本脳炎</b> (小学校就学前のお子様)
	6月	28日(月)			<b>1期初回(2回)</b> ●3歳～4歳 6～28日の間隔をあけ、2回接種
	7月	27日(火)			<b>1期追加(1回)</b> ●4歳～5歳 I期初回終了後、1年の間隔をあける
	8月	31日(火)			
	10月	5日(火)			
	11月	16日(火)			
	12月	21日(火)			
	1月	25日(火)			
	3月	7日(月)			
水ぼうそう(水痘) 麻しん風しん	4月	7日(水)	保健福祉センター	午後1時から 1時25分	<b>同時接種</b> <b>麻しん風しん(1期)</b> 1歳～ <b>水ぼうそう(1回目)</b> 2歳未満 麻しん風しんワクチンと 水痘ワクチンを同日に片腕ずつ接種します。
	5月	12日(水)			<b>単独接種</b> 1回目(麻しん風しんのとの同時接種) 接種後、6ヶ月以上の間隔をあけ、 3歳の誕生日前日までに 水ぼうそうの2回目の単独接種をします。
	6月	2日(水)			
	7月	7日(水)			
	8月	11日(水)			
	9月	15日(水)			
	10月	27日(水)			
	12月	1日(水)			
	1月	12日(水)			
	3月	2日(水)			

## 就学後

日本脳炎	9歳以上13歳未満 (9歳以上10歳未満)	1回	9歳の誕生日前後に案内を通知します。
二種混合	11歳以上13歳未満 (11歳以上12歳未満)	1回	11歳の誕生日前後に案内を通知します。
子宮頸がん予防ワクチン	小学6年生～高校1年生となる年齢の 女子	3回	1回目を0月として以降1ヶ月後、6ヶ月後に接種 ※予防接種を希望される方は、ご連絡ください。

お子さんの体調はよいですか。

(接種会場で体温測定しますが、当日の朝も検温しお子様の体調を観察してください。)

今までにひきつけ・けいれんをおこしたことのある方、体調の悪い方、特別な病気：先天異常・心臓・腎臓・肝臓・脳神経・免疫不全等にかかったことのある方は、事前にかかりつけの担当医に予防接種を受けてよいかの確認をしてください。)

- ① 今日受ける予防接種について、必要性、効果及び副反応など理解していますか。
  - ② 母子健康手帳・予診票は持ちましたか。
  - ③ 受付時間内におこしてください。
  - ④ 必ず保護者の方が同伴してください
- 母子健康手帳を忘れた方や、  
受付時間を過ぎた方は  
予防接種を受けることができません。

接種後は、待機せず帰宅していただきますが、  
接種後30分以内起きる副反応にはご注意ください。  
下記の場合にはすぐに受診を  
●汗がたくさん出る ●顔が急に腫れる ●嘔吐、  
吐き気 ●声が出にくい

ワクチン名	種類	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳～1歳3ヶ月	1歳4ヶ月～1歳5ヶ月	1歳6ヶ月～1歳11ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳			
ロタワクチン	生	1	2	3	4	5	* ロタテック:5価のみ3回接種																			
小児肺炎球菌	不活化	1	2	3	4	5																				
ヒブ(Hib)	不活化	1	2	3	4	5																				
B型肝炎	不活化	1	2	3	4	5																				
四種混合	不活化	1	2	3	4	5																				
BCG	生							1																		
麻しん風しん	生										1															
水とう	生											1														
日本脳炎	不活化													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
二種混合	不活化																				1					

【マークの説明】 生 生ワクチン 不活化 不活化ワクチン 1 接種時期(数字は接種回数) 標準的な接種年齢 接種可能な期間