

## 予防接種について

◆定期接種：定められた期間であれば公費（無料）で受けられる予防接種で、接種の対象者は法律により定められています。対象の方へ接種の期日、場所等個別通知します。

### 個別接種

指定の医療機関で予防接種を受けていただきます。詳しくは対象の方に郵送します案内をご覧ください。  
同日に2種類以上のワクチンを接種する同時接種も可能です。  
ただし、医療機関により同時接種を行わない場合や、可能なワクチンの数が異なりますので、予約の際にご確認ください。

### 乳幼児

予防接種名	対象者(標準的な接種期間)	回数	間隔等
ロタウイルス	ロタテック5価:生後6週～生後32週まで ロタリックス1価:生後6週～生後14週6日まで *最初に受けたワクチンと同じ種類を接種してください	ロタテック(3回)	27日以上の間隔をあけて3回経口接種
		ロタリックス(2回)	27日以上の間隔をあけて2回経口接種
ヒブ	初めてヒブを受ける方は、ワクチンの準備が出来次第、5種混合ワクチンで接種します。 後2ヶ月～5歳未満 (初回:生後2ヶ月～生後7ヶ月未満)	初回;3回	27日以上の間隔をあけて3回接種
		追加;1回	初回接種終了後7月～13月の間隔をあけて1回接種
肺炎球菌 *13価⇒15価に変わります	生後2ヶ月～5歳未満 (初回:生後2ヶ月～生後7ヶ月未満) (追加;1歳～1歳3ヶ月未満)	初回;3回	27日以上の間隔をあけて3回接種
		追加;1回	初回接種終了後60日以上の間隔をあけて、1歳に至った日以降に1回接種
四種混合 ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ	生後2ヶ月～7歳6ヶ月未満 (初回:生後2ヶ月～1歳未満)	初回;3回	20日以上の間隔をあけて3回接種
		追加;1回	初回接種終了後、約1年から1年6ヶ月の間隔をあけて1回接種
五種混合 ジフテリア・破傷風 百日せき・ポリオ ヒブ	生後2ヶ月～7歳6ヶ月未満 (初回:生後2ヶ月～1歳未満)	初回;3回	20日以上の間隔をあけて3回接種
		追加;1回	初回接種終了後、約1年から1年6ヶ月の間隔をあけて1回接種
B型肝炎	生後2ヶ月～1歳未満 (生後2ヶ月～生後9ヶ月未満)	初回;2回	27日以上の間隔をあけて2回接種
		追加;1回	第1回目の接種から139日以上の間隔をあけて1回接種
BCG	生後5ヶ月～8ヶ月未満	1回	
日本脳炎	3歳～7歳6ヶ月未満	初回;2回	6～28日の間隔をあけて2回接種 生後6ヶ月より接種できますが、標準的な接種時期である3歳頃に通知をしています。早めの接種を希望される場合はご連絡ください。
		追加;1回	初回接種終了後、おおむね1年の間隔をあけて1回接種
麻疹風しん	1期 1歳～2歳未満 2期 小学校入学前の1年(年長)	1期;1回	
		2期;1回	
水痘	1歳～3歳未満	2回	6ヶ月～12ヶ月の間隔をあけて2回接種

### 就学後

日本脳炎	9歳以上13歳未満	1回	9歳の誕生日前後に案内を通知します。
二種混合	11歳以上13歳未満	1回	11歳の誕生日前後に案内を通知します。
子宮頸がん 予防ワクチン	小学6年生～高校1年生 となる年齢の女子	2回又は3回 ワクチンの種類、接種開始時期により異なります	<b>H9.4.2～H20.4.1生まれの方は、令和7年3月までは公費で接種</b> できます。 ※通知の来ていない方、予診票をお持ちでない方で接種を希望される方はご連絡ください。

### お子さんの体調はよいですか。

接種医療機関で体温測定しますが、当日の朝も検温しお子様の体調を観察してください。  
今までにひきつけ・けいれんをおこしたことがある方、体調の悪い方、特別な病気:先天異常・心臓・腎臓・肝臓・脳神経免疫不全等にかかったことのある方は、事前にかかりつけの担当医に予防接種を受けてよいかの確認をしてください。

- 今日受ける予防接種について、必要性、効果及び副反応など理解していますか。
- 母子健康手帳・予診票は持ちましたか。
- 受付時間内におこしてください。
- 必ず保護者の方が同伴してください

母子健康手帳を忘れた方や、  
受付時間を過ぎた方は  
予防接種を受けることができません。